



# Gefäßvorsorge

*so früh wie möglich!*

Gefäßtag - 12. November 2011



## Bauchaortenaneurysma die stumme Gefahr

**Frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Risikofaktoren  
für Gefäßerkrankungen rettet Leben**

eine Aktion des Österreichischen Verbandes für Gefäßmedizin (ÖVG): [www.vascmed.at](http://www.vascmed.at)



# Gefäßvorsorge

## Was ist ein **Bauchaortenaneurysma**?

Ein Aneurysma ist eine **Erweiterung einer Schlagader**, die in allen Körperregionen auftreten kann. Eine wesentliche **Häufung von Aneurysmen** werden im **Bereich der Bauchs Schlagader** (Bauchaorta) unterhalb des Abgangs der Nierenarterien gefunden.

Die **Gefahr** bei einem Bauchaortenaneurysma ist darin zu sehen, dass dieses **Aneurysma einreißen** kann und damit zum **innerlichen Verbluten** führt. Ein weiteres Risiko besteht in der Bildung von Blutgerinnsel im Bereich des Aneurysma welche ausgeschwemmt werden können und zu **Gefäßverschlüssen im Bereich der Beine** führen.

Bauchaortenaneurysma entstehen in erster Linie durch eine Wandschwäche im Rahmen eines Gefäßverkalkungsprozesses. Somit sind **Risikofaktoren** wie ein **erhöhter Cholesterinwert**, ein **erhöhter Blutdruck** und **Rauchen** wesentliche Risikofaktoren die es zu behandeln gilt.

## Wie kann ein **Bauchaortenaneurysma festgestellt** werden?

In erster Linie ist es die ärztliche Untersuchung durch **Abtasten des Bauches** sowie durch die **Ultraschalluntersuchung** des Bauches die ein Aneurysma erkennen lässt. Für die exakte Therapieplanung ist auch eine **Computertomographie** notwendig.

## Wie kann ein **Bauchaortenaneurysma behandelt** werden?

Operativ wird eine Bauchaortenaneurysma durch das **Einnähen von Gefäßprothesen** in den erkrankten Gefäßbereich saniert und damit die Gefahr des Einreißen der Gefäßwand behoben.

Eine weitere Methode zur Sanierung des Bauaortenaneurysma stellt die **Stent-Prothese** dar, die über die Leistenarterie eingebracht wird und im Aneurysmabereich von innen her das Aneurysma schient und somit die Rupturgefahr (Einreißen der Hauptschlagader) ebenfalls beseitigt.

## Wie schütze ich mich vor einem **Bauchaortenaneurysma** bzw. verhindere das weitere Wachstum?

**Regelmäßige ärztliche Untersuchungen** erhöhen die Wahrscheinlichkeit ein Bauchaortenaneurysma frühzeitig zu erkennen. **Risikofaktoren** können so **frühzeitig erkannt und behandelt** werden und verhindern so das Auftreten bzw. das Fortschreiten dieser Gefäßerkrankung.

**Mehr über die Gefäßvorsorge und Therapiemöglichkeiten bei Gefäßerkrankungen erfahren Sie bei der nächsten Vorsorgeuntersuchung bei Ihrem Arzt!**

**Gefäßvorsorge - so früh wie möglich!!**



Österreichischer Verband für Gefäßmedizin (ÖVG)

[www.vascmed.at](http://www.vascmed.at)

